

# ПЕНЕСТЕР®

Ингибитор 5-альфа-редуктазы<sup>1</sup>



## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ПЕНЕСТЕР®

**Международное непатентованное название:** Финастерид.

**Фармакотерапевтическая группа:** 5-альфа-редуктазы ингибитор.

**Показания к применению:** лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и профилактика урологических осложнений с целью: снижения риска острой задержки мочи; снижения риска необходимости проведения хирургических вмешательств. Лечение с целью уменьшения размеров увеличенной предстательной железы, улучшения мочеиспускания и уменьшения выраженности симптомов, связанных с ДГПЖ. В сочетании с альфа-1-адреноблокаторами для снижения риска прогрессирования симптомов, связанных с ДГПЖ.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет, беременность и применение у женщин с сохраненным репродуктивным потенциалом, наследственная непереносимость лактозы.

**Способ применения и дозировка:** Внутрь, по 5 мг 1 раз в сутки,

независимо от приема пищи. Продолжительность терапии до оценки ее эффективности должна составлять не менее 6 мес, поэтому курс лечения должен быть достаточно длительным. Препарат Пенестер® можно применять в виде монотерапии, а также в комбинации с альфа-1-адреноблокаторами.

**Побочные явления:** Со стороны половых органов и молочных желез: часто — нарушение сексуальной функции; нечасто — уменьшение объема эякулята, увеличение и болезненность в области грудных желез; неизвестной частоты — болезненность яичек, нарушение эякуляции, эректильная дисфункция, сохраняющаяся после прекращения терапии; мужское бесплодие и/или снижение качества семенной жидкости (см. полную инструкцию по применению).

**Форма выпуска:** таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг № 30 и № 90

## ZENTIVA

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ООО «Зентива Фарма» 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, офис 2, тел.: +7 (499) 350-13-48

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пенестер

# ФОКУСИН®

α1-адреноблокатор<sup>1</sup>



## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ФОКУСИН®

**Международное непатентованное название:** тамсулозин.

**Фармакотерапевтическая группа:** α1-адреноблокатор.

**Показания к применению:** лечение функциональных расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, ортостатическая гипотензия (в т. ч. в анамнезе), выраженная печеночная недостаточность. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

**Способ применения и дозировка:** препарат назначают по 400 мкг (1 капсула) в сутки.

**Особые указания:** до начала терапии препаратом Фокусин® необходимо исключить наличие других заболеваний, которые могут вызывать такие же симптомы, как и доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Перед началом лечения и регулярно во время терапии должно проводиться обследование предстательной железы (пальцевое ректальное обследование,

определение простатического специфического антигена (ПСА).

**Побочные явления:** нарушения со стороны нервной системы. Часто: головокружение. Частота неизвестна: нарушения эякуляции, в том числе ретроградная эякуляция, снижение либидо (см. полную инструкцию по применению).

**Передозировка:** симптомы: выраженное снижение артериального давления.

**Лечение:** кардиотропная терапия, контроль функции почек, общая поддерживающая терапия, введение объемозамещающих растворов или сосудосуживающих препаратов. Для предотвращения дальнейшей абсорбции тамсулозина возможно промывание желудка, прием активированного угля или осмотического слабительного.

**Форма выпуска:** капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг. По 10 капсул в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

## ZENTIVA

### 10 лет заботимся о мужском здоровье!